

とろみ調整食品





飲み込みにくいと感じる方が おいしく、楽しく炭酸飲料を摂取するために







つるりと 飲み込みやすい!

- ●付着性が低く、ベタつくような粘性はありません。
- ●唾液に含まれる分解酵素 (アミラーゼ) の影響を受けません。

こだわり

炭酸飲料の おいしさそのまま!

- ●透明感のある仕上がりが、飲料本来の色調を活かします。
- ●無味無臭なので、飲料本来の味をそこないません。



扱いやすい!

- ●ペットボトル入りの炭酸飲料にとろみをつけられます。
- ●少量でとろみがつきます。

つるりんこシュワシュプを加えて、振るだけ! (使用方法)

1 23%に、を加える 2 逆さまにした状態で振る 3 冷蔵庫で冷やす 4 とろみがつく



とろみをつけたい 炭酸飲料を開栓し、 本品を<mark>一気</mark>に加えます。



すぐにキャップを閉め、逆さまにした状態で 30秒程度、素早く強く振り続けてください。



そのまま**3時間**程度 冷却します。



コップなどに出し、 とろみの状態を 確認してから お召し上がりください。

添加量の目安

●350mlの炭酸飲料に 本品1本を 加えてください。


使用上のポイント


- ●よく振って、しっかりと冷却することで炭酸感のあるとろみがつきます。
- ●本品を一気に加えて、素早く振り始めてください。※振り方が弱い場合、振り始めが遅い場合はダマが生じやすくなります。
- ●溶かしにくい場合は、50ml程度炭酸飲料を抜いてから本品を加えてください。











使用、保管上の注意

- 1 本品はコーラ等の炭酸飲料にとろみをつけるためのとろみ調整食品で、新たに炭酸感を付与するものではありません。
- ② 食べる方(のえん下機能)によって、適切なとろみの強さが異なります。医師・歯科医師・管理栄養士・薬剤師・言語聴覚士等のご指導に従って使用してください。
- 3 包装容器が破損しているものは使用しないでください。
- ♠ 開封時に内容物の色・臭い・味に異常があるもの及び固まっているものは使用しないでください。
- 本品を一度に多量に加えたり、一度とろみをつけた食品に再度本品を加えると、ダマが生じることがあります。ダマがある場合は取り除いて使用してください。
- ダマやとろみを強くつけすぎたもの、または粉末をそのまま食べると、喉につまるおそれがありますので、絶対に食べないでください。本品を使用することで確実に誤えんが防げるものではありません。
- ⑦ 使用量が同じでもとろみをつける飲料の種類や温度によって、とろみの強さや安定するまでの時間が異なります。 必ずコップなどの別容器に移し、とろみの状態を確認してからお召し上がりください。
- 🔞 冷却時間が短かったり、炭酸飲料の種類によってはお召し上がりの際にふきだすことがありますのでご注意ください。
- 🕠 本品を摂りすぎると、体調や体質によりお腹がはる場合、ゆるくなる場合があります。このような場合は使用量を減らしてください。
- 🕦 食事介助が必要な方は飲み込む力に差がありますので、介助者の方は飲み込むまで様子を見守ってください。
- ② 薬と一緒にご使用になる場合は、医師・薬剤師等のご指導に従ってください。
- 📵 開封後は吸湿しやすいので、個包装開封後に全量使用しない場合には、開封部を密封し、できるだけ早く使用してください。
- ⚠ 直射日光があたる場所、湿度の高い場所、冷蔵庫での保管は避けてください。
- 介護や介助の必要な方や、お子様の手の届かないところに保管してください。

包装規格		
251/AC (\$		
アルミスティック		
2.5g×30本 (1袋)		

米養成分		(100g当たり)
熱	量	317 kcal
たんぱく	く質	1.2 g
脂	質	0 g
炭水化	物	78.0 g
食塩相主	当量	4.3 g

原材料名

デキストリン/キサンタンガム、 クエン酸三ナトリウム、 乳酸カルシウム

賞味期限 製造日より18ヶ月

アレルゲン(表示推奨品目含む)

不使用

本品についてお気づきの点がございましたら、下記へお問合せください。

製品に関するお問合せ -

🚣 森永乳業クリニコ株式会社

© 0120-52-0050



© 0800-170-5541

平日9:00~17:30、土曜日9:00~17:00 日曜・祝日・夏季休暇・年末年始は除く



